



'Фестива Максима'



'Зе Фон'



'Рэд Грейс'

## Как выбрать пион

К 75-ЛЕТИЮ КЛУБА «ЦВЕТОВОДЫ МОСКВЫ»

Несмотря на изобилие новых культур, пришедших в последние годы на российский рынок, травянистые пионы по сей день остаются непревзойденными по популярности. Существующие сорта способны удовлетворить самые разные вкусы и фантазии даже наиболее искушенных цветоводов. Но у такого изобилия есть и обратная сторона: масса новинок на выставках цветов и в каталогах торговых фирм затрудняют выбор для широкого круга любителей. Немаловажно и то, что пионы – многолетники-долгожители, а стоимость посадочного материала весьма высока.

Решив посадить в своем саду пионы, прежде всего, следует проследить происхождение понравившихся сортов. Знание характеристик садовых групп, обусловленных видовым происхождением, дает представление о назначении того или иного сорта.

### Садовые группы травянистых пионов

#### ● Молочноцветковые (от *P. lactiflora*).

*Форма цветка:* махровая, полумахровая, японская, анемоновидная, простая.

*Окраска лепестков:* белая, кремовая, розовая, пурпурная, красная и их комбинации.

*Сроки цветения в Подмоскowie:* с середины июня по первую декаду июля.

*Продолжительность жизни:* не менее 30 лет. Известны факты успешного цветения в течение 50 и более лет.

Укрытие на зиму в средней полосе России не требуется.

*Использование:* срезка, ландшафтные посадки, композиции.

#### ● Г1. Гибриды п. лекарственного и п. иноземного (*P. lactiflora* x *P. officinalis*, *P. lactiflora* x *P. peregrina*).

*Форма цветка:* махровая, полумахровая, японская, простая.

*Окраска лепестков:* белая, кремовая, розовая, красная, красная с оттенком оранжевого, коралловая.

*Сроки цветения в Подмоскowie:* с 10 по 25 июня.

*Продолжительность жизни:* обычно не менее 10–12 лет.

Укрытие на зиму в средней полосе России не требуется.

*Использование:* срезка, ландшафтные посадки, композиции.

#### ● Г2. Гибриды п. тонколистного (*P. lactiflora* x *P. tenuifolia*).

*Форма цветка:* простая.

*Окраска лепестков:* насыщенная темно-красная, розовая.

*Сроки цветения в Подмоскowie:* с 25 мая до середины июня.

*Продолжительность жизни:* не менее 10 лет.

Укрытие на зиму не требуется.

*Использование:* ландшафтные посадки, каменистые сады, композиции.

#### ● Г3. Гибриды пионов кавказской флоры – комбинации *P. lactiflora* с *P. macrophylla*, *P. wittmanniana*, *P. mlkosewitschii*.

*Форма цветка:* простая, полумахровая, махровая.

*Окраска лепестков:* белая, кремовая, слоновая кость, персиковая, розовая, с пятном в центре, а также комбинации окрасок.

*Сроки цветения в Подмоскowie:* с 25 мая до 15 июня.

*Продолжительность жизни:* не менее 10 лет.

Укрытие на зиму требуется в бесснежные морозные зимы.

*Использование:* ландшафтные посадки, композиции.

#### ● Видовые пионы.

*Форма цветка:* простая.

*Окраска лепестков:* белая, светло-желтая, кремовая, сиреневая, розовая, пурпурная, красная.

*Сроки цветения в Подмоскowie:* с середины мая до середины июня.

*Продолжительность жизни:* от 10 до 30 и более лет, в зависимости от вида.

Укрытие на зиму не требуется (кроме

'Принцесс Маргарет'



'Корин Версан'





'Гей Пари'



'Катюша Дуброва'



'Велма Аткинсон'

пионов кавказской флоры).  
**Использование:** ландшафтные посадки, сады естественной флоры.

**При выборе пионов цветоводы прежде всего обращают внимание на форму и окраску цветков. По этим признакам можно выделить следующие.**

Хотя прошло более ста лет со времени создания пионов классического стиля, сорта с розовидной или близкой к ней махровой формой цветка остаются основной современной сортимента. Причина, по моему мнению, в том, что эти пионы в представлении большинства из нас — символ щедрости природы, процветания, величия, то есть в современном понимании — праздник жизни и никаких кризисов!

Из старых французских сортов в почете по-прежнему (все махровые): 'Альберт Крусс' (\**Albert Crousse*, 1893) — розовидный, чисто-розово-сиреневый; 'Дюшес де Немур' (\**Duchesse de Nemours*, 1856) — зеленовато-белый; 'Маргарита Жерар' (\**Marguerite Gerard*) — розовидный, кремово-розовый; 'Сара Бернар' (\**Sarah Bernhard*, 1906) — розовидный, розово-сиреневый; 'Фестива Максима' (\**Festiva Maxima*, 1851) — розовидный, чисто-белый; 'Эдулис Суперба' (\**Edulis Superba*, 1824) — розово-сиреневый.

Махровые розовидные современной зарубежной селекции: 'А. Е. Кундред' (\**A. E. Kundred*), 'Глэдис Ходсон' (\**Gladys Hodson*), 'Д-р Джи. Х. Нили' (\**D-r J. H. Neeley*), 'Джозеф Кристи' (\**Joseph Christie*), 'Корин Версан' (\**Corinne Wersan*), 'Эльза Сасс' (\**Elsa Sass*) — белые и кремовые; 'Глори Аллилуйя' (\**Glory Hallelujah*), 'Джеймс Пиллоу' (\**James Pillow*), 'Диннер Плейт' (\**Dinner Plate*), 'Маргарет Кларк' (\**Margaret Clark*), 'Миссис Ф. Д. Рузвельт' (\**Mrs. F. D. Roosevelt*), 'Пинк Джаз' (\**Pink Jazz*), 'Принцесс Маргарет' (\**Princess Margaret*) — розовые;

'Бест Мэн' (\**Best Man*), 'Мьюзик Мэн' (\**Music Man*), 'Канзас' (\**Kansas*), 'Поль М. Уайлд' (\**Paul M. Wild*), 'Ренато' (\**Renato*), 'Феликс Сюрип' (\**Felix Supreme*) — красные;

'Брайдл Айсинг' (\**Bridal Icing*), 'Брайдл Шауэр' (\**Bridal Shower*), 'Чеддер Сюрпрайз' (\**Cheddar Surprise*), 'Чеддер Чиз' (\**Cheddar Cheese*) — двухцветные (наиболее популярно сочетание белого и желтого); 'Зе Фон' (\**The Fawn*), 'Памяти Гагарина' (\*отечественный), 'Пинк Радянс' (\**Pink Radiance*) — бледно-розовые с более ярким крапом.

Все вышеперечисленные сорта относятся к группе молочнокветковые, многие обладают приятным запахом (отмечены \*).

Межвидовые гибриды пополнили классическую коллекцию: 'Балерина' (\**Ballerina*) — белая окраска; 'Гуди' (\**Goody*), 'Джерри' (\**Gerry*), 'Этчд Сэмон' (\**Etched Salmon*) — розовые; великоколпные красные сорта — 'Генри Бокстос' (\**Henry Bockstoece*), 'Джин Бокстос' (\**Jean Bockstoece*), 'Кэрол' (\**Carol*), 'Олд Фейфул' (\**Old Faithful*), 'Рэд Грейс' (\**Red Grace*).

● **Пионы экзотические: японские и анемоновидные.**

Сорта с японской формой цветка чаще всего используются в ландшафтных посадках и цветочных аранжировках. У них простой венчик, имеющий 1–2 ряда лепестков, а тычинки трансформированы в тоненькие стаминодии (Ст), придающие цветку необычную изысканность. Окраска двухцветная — неодинаковая у венчика и стаминодий. Последние у темноокрашенных сортов тоже двухцветные — их основной тон как у венчика, а края и кончики — золотисто-желтые. У наших цветоводов популярны: 'Бу Те' (\**Bu Te*); 'Джон ван Леувен' (\**John van Leeuwen*); 'Йеллоу Кинг' (\**Yellow King*); 'Лотус Куин' (\**Lotus Queen*) — белые, Ст желтые; 'Вестернер' (\**Westerner*), Ст желтые; 'Кукени Джиши' (\**Kukeni Jishi*) — розовые, Ст светло-желтые; 'Неон'

**Некоторые практические рекомендации по выбору пионов**

- Выбирайте сорта по каталогам фирм или владельцев коллекций с прочной репутацией.
- Избегайте каталогов и сайтов в интернете, изобилующих при описании сортов прилагательными в превосходной степени, восклицательными знаками и другими преувеличениями, затемняющими суть дела.
- Обязательно установите видовое происхождение сорта и оцените его пригодность для ваших климатических условий.

**Приобретая посадочный материал, обратите внимание на некоторые важные показатели.**

- **Размер делёнки.** Она не должна быть слишком крупной (ни в коем случае целое взрослое растение), с большим количеством корней. Достаточным можно считать вес делёнки для сортов п. молочнокветкового — 150 г, для гибридов Г1, Г2, Г3 и видовых пионов — 200 г.
- **Общий вид делёнки.** На рисунках обычно изображают идеальную делёнку с 3 выступающими в разные стороны корнями и корневищем в центре с 3–5 запасующими корнями. На самом деле при делении маточного растения корни у делёнок чаще всего смотрят в одну сторону, а часть корневища с почками находится у края. При правильной посадке это не влияет на дальнейшее развитие растения. Важно, чтобы толщина запасующих корней была не менее 18–20 мм, а их суммарная длина должна быть примерно 15 см у молочнокветковых сортов и 20 см у гибридных. Другими словами, важна не длина и количество корней, а величина общей массы питательных веществ, запасенных этими корнями.
- До посадки у делёнки обязательно полностью удалите остатки стеблей. Если есть гнили, вырежьте их полностью до здоровой ткани. Слишком крупную — поделите на 2 части или укоротите корни. Все срезы затрите золой. После этого подержите посадочный материал на воздухе 2–3 дня, пока места срезов не опробковеют. О том, как правильно сажать пионы, читайте в журнале «Цветоводство» (№ 5, 2008).



Р. Млокосевича

(‘Neon’) – розово-сиреневый, Ст розовые с желтым краем; ‘Акрон’ (‘Akron’); ‘Баррингтон Белл’ (‘Barrington Bell’); ‘Уолтер Мейнс’ (‘Walter Mains’) – красные, Ст красные с желтым краем.

Анемоновидная форма цветка близка к японской, но тычинки превратились в петалодии (Пт). Пт значительно шире и крупнее, чем Ст цветков японской формы. Венчик и Пт окрашены контрастно. В последнее время анемоновидные пионы стали очень популярны: ‘Гей Пари’ (‘Gay Paree’) – розово-красный, Пт кремовые с розовым краем; ‘Велма Аткинсон’ (‘Velma Atkinson’) – розово-сиреневый, Пт кремовые с розовыми кончиками; ‘Кора Стабе’ (‘Cora Stubbs’) – сиреневорозовый, Пт светло-желтые; ‘Курильские Острова’ – розово-сиреневый, Пт светлые с розовым хохолком; ‘Нелли Сейлор’ (‘Nellie Saylor’) – красно-виновый, Пт бело-красные; ‘Уайт Кэп’ (‘White Cap’) – темно-пурпурный, Пт кремово-белые; ‘Уайт Сэндз’ (‘White Sands’) – белый, Пт желтые.

Все эти сорта средние и среднепоздние, цветут в третьей декаде июня.

● **Пионы видовые и раннецветущие.**

В этой группе можно подобрать пионы от самых ранних сроков цветения (с 20-х чисел мая) по 10 июня. Они наиболее подходят для посадки в рокариях и на альпийских горках, в садах природной

‘Светлана Удинцева’

флоры, миксбордерах и различных композициях. К раннецветущим относятся гибриды групп Г2 и Г3 (см. выше) и некоторые гибриды группы Г1. Все виды, указанные ниже, также относятся к ранним.

Р. Млокосевича (*P. mlokosewitschii*) – цветок простой, светло-желтый, листья декоративные, с округлыми долями, светлые голубовато-зеленые, цветет с 20 мая. Р. лекарственный (*P. officinalis*), садовая махровая форма ‘Рубра Плена’ – темно-красный, цветет с 5–7 июня.

Р. тонколистый (*P. tenuifolia*) – простой, темно-красно-пурпурный, листья перисторассеченные, цветет с 20 мая.

Раннецветущие гибриды: ‘Афина’ (‘Athena’) – полумахровый, розово-кремовый, с карминовым пятном, цветет с 27 мая; ‘Балерина’ (‘Ballerina’) – Г3, махровый, белый с зеленовато-желтым оттенком, цветет с 29 мая; ‘Лунная Дорога’ – Г3, простой, кремово-желтый, цветет с 25 мая; ‘Корал Сансет’ (‘Coral Sunset’) – Г1. Полумахровый, огромный чашевидный, сверкающий ярко-коралловый, цветет с 7 июня; ‘Корал Сюрприз’ (‘Coral Supreme’) – Г1, полумахровый (почти махровый), яркий светло-коралловый, цветет с 9 июня; ‘Ледди’ (‘Laddie’) – Г2, простой, яркий темно-красный, цветет с 30 мая; ‘Офелия’ – Г1, махровый, темно-пурпурный, зацветает в начале июня.

● **Безусловно надежными в наших клима-**

‘Памяти Академика Цицина’

тических условиях можно считать сорта пионов отечественной селекции. Справедливости ради надо сказать, что на выставках они выглядят вполне достойно рядом с современными западными культиварами, а в саду отличаются жизнестойкостью, быстрым развитием и обильным цветением. После периода повышенного спроса на западные новинки в последние годы явно растет интерес к отечественным сортам.

Приоритетным направлением в СССР, а позднее в СНГ (Россия, Украина, Казахстан) было получение культиваров с махровыми розовидными цветками. Сегодня среди наиболее популярных можно назвать следующие культивары: ‘Антарктида’, ‘Весильна’, ‘Памяти Академика Цицина’, ‘Юбилейный’ – белые и кремовые; ‘Варенька’, ‘Лыбедь’, ‘Памяти Гагарина’, ‘Премьера’, ‘Светлана Удинцева’, ‘Скарбница’, ‘Сольвейг’ – розовые; ‘Аркадий Гайдар’, ‘Антей’, ‘Марсианин’, ‘Свиточ’ – красные;

Появились сорта с японской формой цветка: ‘Жемчужная Россыпь’ – розово-перламутровый; ‘Золотое Руно’ – малиново-розовый; ‘Курильские Острова’ – розово-сиреневый; ‘Мамино Сердечко’ – белый, ‘Мираж’ – светло-малиновый; ‘Сюрприз’ – розовый. ●

**В. ДУБРОВ,**

член клуба «Цветоводы Москвы»



‘Афина’



‘Новость Алтая’



‘Мисс Америка’